

Vos questions, nos réponses sur votre traitement anticoagulant : ELIQUIS® (apixaban)







				8	9
--	--	--	--	---	---

Nom, Prénom :	
	-

Vous prenez de l'ELIQUIS® dosé à ____ mg, deux fois par jour.

(Brochure d'informations à destination des patients atteints de FANV)



Centre hospitalier de Cannes

Service Pharmacie
Brochure d'informations anticoagulant-ELIQUIS®

Dernière mise à jour : Mai 2018




Pourquoi doit-on prendre ELIQUIS® tous les jours?

Vous souffrez de fibrillation auriculaire.

Les battements de votre cœur ne suivent pas un rythme régulier.

Le cœur est une pompe qui permet au sang de circuler dans notre corps. Il est composé de quatre compartiments.



Lorsque l'on souffre de fibrillation auriculaire, les mouvements du cœur sont irréguliers.

Si le sang reste dans un compartiment du cœur, des amas de sang peuvent se former. On les appelle aussi caillots ou thrombus.


Si l'un des caillots est entrainé dans la circulation sanguine, il peut se déplacer, il peut boucher une artère du cerveau.

Cela peut provoquer des dégâts importants, par exemple un AVC : Accident Vasculaire Cérébral.



Situation normale:

Le sang circule normalement.



Situation anormale: Le vaisseau est bouché, le sang ne circule plus.

Amas de globules rouge : caillot

Pour empêcher un tel accident, vous devez prendre chaque jour votre anticoagulant: ELIQUIS®.

Il permet de fluidifier, de rendre plus liquide votre sang et évite l'apparition des caillots.

Page 2 sur 8



Comment bien prendre son anticoagulant?

ELIQUIS® se prend:

- le matin et le soir : deux fois par jour,




- toujours aux mêmes horaires, par exemple à 8h et 20h,
- tous les jours,
- pendant ou en dehors des repas.

Vous pouvez **écraser** les comprimés et les mélanger à un jus de fruit ou de la compote.



Et si j'oublie?



Prenez le comprimé oublié.

Ne prenez pas le comprimé oublié.

Si vous oubliez **le comprimé du matin**, retenez que vous avez **jusqu'à 14h** pour le prendre. Après 14h, ne prenez pas le comprimé oublié.

Prenez le comprimé du soir à l'heure habituelle.

Si vous oubliez **le comprimé du soir**, vous avez **jusqu'à minuit** pour le prendre. Après minuit, ne prenez pas le comprimé oublié. Prenez le comprimé du matin à l'heure habituelle.



Ne jamais prendre deux comprimés en une fois pour compenser un oubli.



Et si j'ai pris deux comprimés au lieu d'un?



Existe-il des risques à prendre un anticoagulant ?

Oui, vous pouvez saigner.

En effet, l'anticoagulant permet d'éviter la formation de caillot mais il empêche aussi la formation des croûtes au niveau d'une plaie.

Les plaies saigneront plus longtemps et mettront plus de temps à se refermer.

Bricoleurs, jardiniers, cuisiniers : soyez prudents, évitez les coupures ! Evitez les sports de combat, le rugby, ... sports à risques de blessures et saignements.

Sachez que vous aurez plus souvent de petits saignements visibles :

- saignements des gencives
- saignements du nez
- apparition de « bleus » (ecchymoses)

Contacter votre médecin si les saignements durent plus longtemps que d'habitude.

Vous risquez aussi d'avoir des saignements non visibles, dans votre corps. Contacter votre médecin sans attendre :

- si vous êtes pâle, plus fatigué ou essoufflé qu'habituellement
- si vous avez un mal de tête qui ne s'arrête pas
- si lorsque vous allez aux toilettes vos selles (caca) sont noires et ont une odeur différente/inhabituelle ou rouges,
- si lorsque vous allez aux toilettes, vos urines (pipi) sont rosées.



Informez médecin, dentiste, infirmière, chirurgien, anesthésiste, pharmacien ... **que vous prenez ELIQUIS**°.

Les piqûres dans les muscles ou dans les articulations (infiltrations) sont **interdites**.

Si vous devez vous faire arracher une dent, Si vous devez vous faire opérer,





Prévenez votre dentiste, votre médecin, il vous donnera les instructions à suivre.



Existe-il des médicaments à ne pas prendre en même temps que l'ELIQUIS®?

ELIQUIS® est un médicament qui peut provoquer des saignements. Il ne faut pas le prendre avec d'autres médicaments ayant ce même effet.







De nombreux médicaments utilisés pour soulager la **douleur** sont à éviter. Pour soulager un mal de tête, vous pouvez prendre du **paracétamol** (sauf si vous y êtes allergique ou que vous avez des problèmes de foie).

Il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires comme : aspirine, ibuprofène, kétoprofène, de diclofénac ...



Vous pouvez prendre:

Paracétamol : DAFALGAN® DOLIPRANE® EFFERALGAN®



Vous ne devez pas prendre:

Aspirine : ASPEGIC®

Ibuprofène: ADVIL®, NUROFEN®,

SPEDIFEN®

Diclofénac : VOLTARENE® Kétoprofène : PROFENID ® ...

D'autres médicaments et certaines plantes peuvent aussi **augmenter les effets de ELIQUIS**[®] (millepertuis, rifampicine ...).

Il ne faut pas les prendre.

→ Donnez la **liste complète** des médicaments que vous prenez à votre médecin et à votre pharmacien.

N'oubliez pas ceux disponibles sans ordonnance ou ceux à base de plantes.

→ Ne prenez aucun autre médicament sans l'accord de votre médecin ou l'avis d'un pharmacien.





Doit-on suivre un régime alimentaire particulier?

Non, ce médicament ne nécessite pas de régime particulier.

Aucun aliment n'est interdit.

Vous pouvez manger de tout.













Si vous souhaitez boire des tisanes à base de plantes pour mieux dormir, ou prendre des vitamines pour être en forme : demandez conseil à votre pharmacien.



Doit-on faire régulièrement des analyses de sang lorsque l'on est sous ELIQUIS®?



ELIQUIS® va modifier certains résultats de votre prise de sang. C'est le signe que le traitement fonctionne. Votre médecin pourra être amené à contrôler ces résultats.



Vos **reins** et votre **foie** permettent d'évacuer le médicament. Avant de débuter le traitement, puis régulièrement, votre médecin vérifie qu'ils fonctionnent bien.



Peut-on voyager lorsque l'on est sous ELIQUIS®?



Bien sûr, à condition d'avoir toujours sur vous votre médicament. **Assurez-vous** que votre médicament soit **disponible** sur votre lieu de vacances.

Méfiez-vous du décalage horaire.

Faites le point avec votre pharmacien avant votre départ.



Peut-on prendre ELIQUIS® si l'on est enceinte ?



Non.


Si vous attendez un enfant, vous ne devez pas prendre ce médicament. Vous ne devez pas nourrir votre enfant avec votre lait.

Parlez-en avec votre gynécologue.

Page 6 sur 8

Résumons:





- ✓ Je prends :
 - Un comprimé matin et soir
 - Tous les jours
 - Au même moment dans la journée
- ✓ **J'informe** mes médecins, dentistes, infirmiers, pharmaciens ...
- ✓ Je ne prends pas de médicaments ou de produits à base de plante sans l'avis de mon médecin ou de mon pharmacien.
- ✓ **J'alerte** si je saigne, ou si je suis fatigué, si mes selles sont anormalement noires ou rouges.

Définitions:

Anticoagulant: médicament empêchant la coagulation.

Anticoagulants oraux directs (AOD): médicament anticoagulant qui se prend par la bouche et qui agit directement sur un élément de la coagulation.

Coagulation : solidification du sang : formation de caillots, cela permet de reboucher une plaie, mais peut aussi boucher une artère ou une veine.

Fibrillation auriculaire –fibrillation atriale (FA): trouble du rythme du cœur caractérisé par la contraction rapide et inefficace des oreillettes du cœur.

Arythmie: trouble du rythme du cœur

Auricule : creux présent dans la partie haute d'un compartiment du cœur : les oreillettes.

Thrombus = un caillot : masse de sang coagulée.

Carte à détacher, à remplir et à avoir sur vous.

Présentez-la à tout professionnel de santé que vous pourriez rencontrer : médecin, dentiste, infirmier ...

Glissez-la dans votre portefeuille, sac à main ...

Emplacement carte

N'hésitez pas à consulter votre **médecin** ou prendre conseil auprès de votre **pharmacien**.

Vous pouvez aussi appeler Médicament Info Service.







Une question pratique sur vos médicaments?

Nous pouvons y répondre

04 93 69 75 95

du Lundi au Vendredi de 9h à 18h medicament.infoservice@ch-cannes.fr

Des pharmaciens spécialisés, à votre écoute, pour répondre en toute sécurité, aux questions que vous vous posez sur vos médicaments!